

Sommerpflege bei Nadelbäumen

Bei Lärchen sollen die Triebe solange wachsen dürfen, bis sie ausgereift sind, anschließend werden sie auf 2 Knospen zurückgeschnitten. Dasselbe gilt für Wacholder, immerwährendes Zupfen, wie es früher empfohlen wurde, schwächt den Baum. Beim Wacholder sind innere braune und schwache Triebe zu entfernen, damit Licht ins Innere kommt.

Austriebe von Fichten und 5 nadeligen Kiefern wurden bereits im Frühjahr gekürzt, so dass im Sommer nicht viel zu tun ist. Über die Sommerpflege von 2 nadeligen Kiefern wird jedoch immer wieder diskutiert. In Japan wird die „kurze Blattschnittmethode“ (Tanbahoo) bevorzugt, die Arbeit des Tribschnittes wird Mekiri genannt.

2 nadelige Kiefern sind u.a. die Schwarzkiefern, *Pinus thunbergii* (Japan), *Pinus nigra* (Europa), sowie die Rotkiefern *Pinus densiflora* (Japan) und *Pinus sylvestris* (Europa). Japan hat den Vorteil, lange Vegetationsperioden zu haben, so dass mühelos 2 Austriebe pro Jahr erzielt werden können. Bei optimalen Bedingungen sollte dies bei den Schwarzkiefern auch in Europa möglich sein. Bei *P. sylvestris* ist immer nur ein Austrieb möglich.

Alle Kiefern sollten in voller Sonne stehen, sie ertragen einen heißen trockenen Standort. Ein ausführlicher Artikel über die *P. sylvestris* ist im letzten BCD Clubheft erschienen.

Hans Kastner hat die Erfahrung gemacht, dass ein ausgereifter Austrieb in unseren Breitengraden schwer möglich ist, daher entfernt er bei allen zweinadeligen Kiefern Mitte August alle neuen Triebe, um im nächsten Jahr mehr Verzweigung und kürzere Nadeln zu bekommen. Diese neuen Triebe werden im 2. Jahr gekürzt, so dass die Wuchskraft ausgeglichen wird. Dazu kommt noch gute Düngung und das Entfernen der alten Nadeln im Winter.

Othmar Auer empfiehlt bei *P. thunbergii*, *densiflora* und *nigra* Mekiri Mitte Juni bis Mitte Juli, d.h. das Entfernen aller neuen Triebe. Die daraufhin erscheinenden Knospen werden auf 2 pro Trieb selektiert und sollten innerhalb von 3 Monaten mit kleinen Nadeln austreiben und ausreifen. Im Winter wird durch Entfernen der alten Nadeln und Reduktion der neuen Nadeln die Wuchskraft für das nächste Jahr ausgeglichen.

Bei *P. sylvestris* werden ebenfalls Mitte Juni bis Juli alle Tribspitzen und Triebe bis auf die gleich Größe entfernt, um an jedem Trieb 2 neue Knospen zu bekommen, die dann im nächsten Jahr austreiben.

Da die Art des Sommerschnittes von 2 nadeligen Kiefern kontrovers diskutiert wird, muss jeder seinen Weg an seinem Standort und mit seinen Pflegebedingungen selbst finden.